






 Albalon[®] naphazoline hydrochloride 0.1% sterile ophthalmic solution		
	Liquifilm[®] DECONGESTANT Contains: Naphazoline hydrochloride 0.1% with the following non medicinal ingredients: benzalkonium chloride 0.004% (as preservative), citric acid, edetate disodium, Liquifilm [®] (polyvinyl alcohol), sodium chloride and sodium citrate.	
Description: Naphazoline hydrochloride is a vasoconstrictor drug which is characterized by a relatively long duration of action. This drug belongs to the imidazoline class of sympathomimetics.		
Actions: Albalon [®] (naphazoline hydrochloride) is useful as a sympathomimetic ocular decongestant for the symptomatic relief of minor ocular irritations and allergies. The long duration of action of naphazoline distinguishes it from many other available agents.		
Indications: For use in symptomatic relief of itching, smarting and redness.		
Contraindications: Hypersensitivity to a component of this medication; patients with narrow-angle glaucoma; not for use in children unless under medical advice.		
Warnings: A severe hypertensive crisis may ensue in patients under MAO inhibitor medication from use of a sympathomimetic drug. CNS depression leading to a coma and marked reduction in body temperature may occur in children, especially infants.		
Precautions: Use only with caution in the presence of hypertension, cardiac irregularities, hyperglycemia (diabetes mellitus), hyperthyroidism and when other medications are being used.		
Adverse reactions: Pupillary dilation with increase in intraocular pressure, systemic effects due to absorption (hypertension, cardiac irregularities, hyperglycemia). Drowsiness may be experienced in some patients. Accidental ingestion (especially in children), may cause marked sedation requiring emergency treatment.		
Adult dosage: 1 to 2 drops in each eye every three to four hours or less frequently. Keep out of reach of children.		
Note: Store at 15° to 25°C. Do not touch dropper tip to any surface as this may contaminate solution.		
How supplied: In 15 mL plastic dropper bottles.		
© 2019 Allergan. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners.		
January 2019		
 Markham, Ontario, Canada, L6G 0B5 Made in Ireland		72125EC11

	 Albalon^{MD} Chlorhydrate de naphazoline 0,1% Solution ophthalmique stérile	
	Liquifilm^{MD} DÉCONGESTIF	
Composition: Chlorhydrate de naphazoline 0,1% avec les ingrédients non médicinaux suivants: acide citrique, chlorure de benzalkonium 0,004% (comme agent de conservation), chlorure de sodium, citrate de sodium, édétate disodique et Liquifilm ^{MD} (alcool polyvinylique).		
Description: Le chlorhydrate de naphazoline est un agent vaso-constricteur qui se caractérise par une durée d'action relativement longue. Ce médicament appartient à la famille imidazole des sympathicomimétiques.		
Actions: Albalon ^{MD} (chlorhydrate de naphazoline) est un décongestif ophtalmique sympathicomimétique qui permet de soulager les symptômes d'allergies et d'irritations oculaires mineures. La longue durée d'action du chlorhydrate de naphazoline distingue cette substance des nombreux autres agents disponibles sur le marché.		
Indications: Soulagement symptomatique des démangeaisons et de la rougeur.		
Contre-indications: Hypersensibilité à un composant du médicament; présence d'un glaucome à angle fermé; ne pas administrer aux enfants sans avis du médecin.		
Avertissement: Une crise hypertensive grave attribuable aux agents sympathicomimétiques peut survenir chez les personnes prenant des inhibiteurs de la MAO; une dépression du SNC résultant en un coma et en une diminution importante de la température corporelle peut se manifester chez les enfants, particulièrement chez les poupons.		
Mise en garde: Utiliser prudemment chez les personnes souffrant d'hypertension, d'anomalies cardiaques, d'hyperglycémie (diabète sucré), d'hyperthyroïde et chez celles prenant d'autres médicaments.		
Réactions indésirables: Dilatation pupillaire accompagnée d'une augmentation de la pression intraoculaire, effets généraux attribuables à l'absorption (hypertension, anomalies cardiaques, hyperglycémie). Certaines personnes peuvent éprouver de la somnolence. L'ingestion accidentelle (particulièrement chez les enfants) peut occasionner une sédation importante et nécessiter un traitement d'urgence.		
Posologie pour adultes: 1 à 2 gouttes dans chaque oeil, toutes les trois à quatre heures ou moins souvent. Gardez hors de la portée des enfants.		
Note: Conservez entre 15° et 25°C. L'extrémité du contenant ne doit toucher aucune surface étrangère, car cela peut contaminer la solution.		
Présentation: Flacons compte-gouttes en plastique de 15 mL.		
© 2019 Allergan. Tous les droits sont réservés. Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.		
janvier 2019		
 Markham, Ontario, Canada, L6G 0B5 Fabriqué en Irlande		72125EC11

0106501



Global Packaging Artwork

Part number 72125EC11
 Drawing number 0106501

- Artwork is actual size
 - Drop template and notes before processing

