

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

Let op bij gebruik van dexamethason (implantaat voor in het oog). Dexamethason is het werkzaam bestanddeel in het medicijn. Uw medicijn kan ook een andere (merk)naam dragen. Kijk dus goed over welk medicijn dit gaat.

Wat moet u doen voor de behandeling?

Voor de behandeling zal uw arts u antibiotische oogdruppels voorschrijven. U moet die gedurende 3 dagen voor de behandeling gebruiken. En u moet ze verder blijven gebruiken gedurende 3 dagen na de behandeling.

Wat houdt de behandeling in?

Om u voor te bereiden op de behandeling, zal de arts:

- uw oog reinigen om infectie tegen te gaan en zal hij/zij eventueel nog antibiotische oogdruppels toedienen
- uw gezicht met een speciale doek bedekken
- uw oog verdoven met een verdovend middel zodat u geen pijn voelt
- een instrument gebruiken om uw oog open te houden

De arts zal dan met een speciaal ontworpen applicator het geneesmiddel in uw oog inspuiten door het wit van uw oog. Tijdens de procedure kunt u een klikkend geluid horen en wat druk op het oog voelen.

Uw arts zal dan routine oogonderzoeken uitvoeren om na te gaan of het geneesmiddel met succes werd toegediend.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Zoals alle geneesmiddelen kan dexamethason (implantaat voor in het oog) bijwerkingen veroorzaken. Niet iedereen krijgt echter bijwerkingen. In de bijsluiter vindt u een gedetailleerde lijst van mogelijke bijwerkingen. Vraag de bijsluiter aan uw arts of verpleegkundige.

Na de injectie kan uw zicht gedurende ongeveer een dag wazig zijn. U kunt ook deeltjes of vlekken zien. Dat is normaal en zal mettertijd verdwijnen. Als die symptomen niet verdwijnen of verergeren, moet u contact opnemen met uw arts.

Als u rijdt of machines gebruikt, mag u dat pas opnieuw doen zodra u niet meer wazig ziet.

U moet onmiddellijk contact opnemen met uw arts als u op een of ander ogenblik een van de volgende symptomen krijgt:

- verslechtering van uw zicht na de injectie
- wazig zicht gedurende meer dan één dag na de injectie
- pijn of ongemak in of rond het oog
- roodheid in het oog die blijft toenemen
- u ziet meer deeltjes of vlekjes
- vochtverlies uit het oog

Dit is het noodnummer dat u moet bellen als u ernstige bijwerkingen of reacties vertoont:

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

Meer informatie

Deze informatie is ook terug te vinden op <https://www.allergan.nl/nl-nl/products/list/ozurdex-700µg>. Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn. Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.

Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

